EXERCICE 2

(Baccalauréat Centres étrangers Groupe 1 19 mai 2022)

Partie A

On considère la fonction f définie pour tout réel x de $]0; 1]$ par :

$$f(x) = e^{-x} + \ln(x).$$

1. Calculer la limite de f en 0.
2. On admet que f est dérivable sur $]0; 1]$. On note f' sa fonction dérivée.
Démontrer que, pour tout réel x appartenant à $]0; 1]$, on a :

$$f'(x) = \frac{1 - xe^{-x}}{x}$$

3. Justifier que, pour tout réel x appartenant à $]0; 1]$, on a $xe^{-x} < 1$.
En déduire le tableau de variation de f sur $]0; 1]$.
4. Démontrer qu'il existe un unique réel ℓ appartenant à $]0; 1]$ tel que $f(\ell) = 0$.

Partie B

1. On définit deux suites (a_n) et (b_n) par :

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 = \frac{1}{10} \\ b_0 = 1 \end{array} \right. \text{ et, pour tout entier naturel } n, \left\{ \begin{array}{l} a_{n+1} = e^{-b_n} \\ b_{n+1} = e^{-a_n} \end{array} \right.$$

- a. Calculer a_1 et b_1 . On donnera des valeurs approchées à 10^{-2} près.
- b. On considère ci-dessous la fonction termes, écrite en langage Python.

```
def termes (n) :
    a=1/10
    b=1
    for k in range(0,n) :
        c= ...
        b = ...
        a = c
    return(a,b)
```

Recopier et compléter sans justifier le cadre ci-dessus de telle sorte que la fonction termes calcule les termes des suites (a_n) et (b_n) .

2. On rappelle que la fonction $x \mapsto e^{-x}$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.
 - a. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a :

$$0 < a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq 1$$

- b. En déduire que les suites (a_n) et (b_n) sont convergentes.
3. On note A la limite de (a_n) et B la limite de (b_n) . On admet que A et B appartiennent à l'intervalle $]0; 1]$, et que $A = e^{-B}$ et $B = e^{-A}$.
 - a. Démontrer que $f(A) = 0$.
 - b. Déterminer $A - B$.

EXERCICE 3

(Baccalauréat S Pondichéry 18 avril 2012)

Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par A et B les points d'affixes respectives 1 et -1 .

Soit f la transformation du plan qui à tout point M d'affixe $z \neq 1$, associe le point M' d'affixe z' tel que :

$$z' = \frac{1-z}{\bar{z}-1}$$

1. Soit C le point d'affixe $z_C = -2 + i$.
 - a. Calculer l'affixe $z_{C'}$ du point C' image de C par la transformation f , et placer les points C et C' dans le repère donné en annexe.
 - b. Montrer que le point C' appartient au cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1.
 - c. Montrer que les points A, C et C' sont alignés.
2. Déterminer et représenter sur la figure donnée en annexe l'ensemble Δ des points du plan qui ont le point A pour image par la transformation f .
3. Montrer que, pour tout point M distinct de A, le point M' appartient au cercle $\mathcal{C}$.
4. Montrer que, pour tout nombre complexe $z \neq 1$, $\frac{z'-1}{z-1}$ est réel.
Que peut-on en déduire pour les points A, M et M' ?
5. On a placé un point D sur la figure donnée en annexe. Construire son image D' par la transformation f .